

Questões de 21 a 35

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.

Questão 21

Sobre as atividades de enfermagem na fase intraoperatória relacionadas à manutenção da segurança do paciente, identifique com **V** as afirmativas verdadeiras e com **F**, as falsas.

- () Gerenciar os recursos humanos, delegando a responsabilidade para o setor administrativo sobre o controle dos equipamentos e suprimentos para o cuidado individualizado do paciente.
- () Transferir o paciente para a mesa ou leito de cirurgia.
- () Posicionar o paciente.
- () Verificar se as contagens de compressas, agulhas e instrumentos estão corretas.
- () Manter o ambiente asséptico apenas durante o tempo de permanência do paciente na sala cirúrgica.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a

- 01) V V V V V
- 02) F V V V F
- 03) F F F V V
- 04) V F F F V
- 05) V V F F F

Questão 22

Em uma ferida cirúrgica, podem ocorrer complicações, como

- 01) deiscência, que é a protusão do conteúdo da ferida.
- 02) evisceração, que é a ruptura da incisão cirúrgica ou da ferida.
- 03) deiscência e evisceração, que são particularmente graves quando envolvem feridas ou incisões abdominais.
- 04) estado nutricional satisfatório ou doença renal em pacientes que se submetem à cirurgia abdominal por causa da idade precoce.
- 05) deiscência, que causa dor e pode estar associada ao vômito.

Questão 23

Na realização do exame para detectar presença de glicose na urina, em paciente internado, a enfermagem deve

- 01) estimular o paciente a ingerir água e solicitar que ele urine somente 30 minutos depois.
- 02) pinçar a sonda por 30 minutos, caso o paciente esteja em uso de sonda de demora, e coletar a urina diretamente da bolsa coletora.
- 03) deixar a fita reagente na urina por, pelo menos, 1 hora.
- 04) encaminhar a fita reagente para o laboratório, após o período recomendado.
- 05) coletar a urina no período da manhã e somente fazer a leitura no período da tarde, garantindo que os corpos cetônicos apareçam na urina.

Questão 24

Sobre as medidas de prevenção, em caso de pneumonia quando o paciente idoso tem como fator de risco reflexo da tosse deprimido, identifique com **V** as afirmativas verdadeiras e com **F**, as falsas.

- () Reposicionar o paciente duas vezes no dia para evitar broncoaspiração.
- () Administrar medicamentos com critérios, principalmente aqueles que aumentam o risco de broncoaspiração.
- () Realizar aspiração quando indicado.
- () Encorajar a tosse efetiva, exercícios respiratórios e dieta nutritiva.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a

- 01) F V V V
- 02) F V V F
- 03) V F F V
- 04) V V F F
- 05) V V V V

Questão 25

Identifique com **V** as afirmativas verdadeiras e com **F**, as falsas. No caso de pacientes adultos com edema agudo do pulmão,

- () a ausculta revela estertores nas bases pulmonares, os quais progridem para os ápices dos pulmões.
- () o paciente pode apresentar taquicardia.
- () os valores da oximetria de pulso começam a aumentar.
- () a análise da gasometria arterial demonstra agravamento da hipoxemia.
- () os estertores, quando ocorrem, são causados pelo movimento do ar através do líquido alveolar.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a

- 01) V V V V V
- 02) V F F F V
- 03) V V F V F
- 04) F V V V F
- 05) F F V V V

Questão 26

Paciente admitido para realização de cirurgia refere que apresenta alergia a látex.

Sobre a assistência de enfermagem em relação a essa informação, identifique com **V** as afirmativas verdadeiras e com **F**, as falsas.

- () Preparar um carrinho de emergência com suplementos para esse tipo de alergia.
- () Realizar a manutenção das precauções contra a alergia a látex durante o período intraoperatório, por ser este o mais crítico.
- () Orientar o paciente sobre quais produtos contém látex e quais produtos são alternativas seguras e sem látex.
- () Aconselhar o paciente a sempre usar uma identificação com a informação.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a

- 01) V V V V
- 02) F F V V
- 03) F V V F
- 04) V F V V
- 05) V F F V

Questão 27

Em uma unidade de clínica médica, resolveu-se categorizar o paciente por grau de complexidade, para que fosse possível organizar a assistência de enfermagem. Assim, aos pacientes crônicos que requeiram avaliações médicas e de enfermagem, estáveis do ponto de vista clínico, porém com total dependência das ações de enfermagem quanto ao atendimento das necessidades humanas básicas, foram considerados como pacientes que

- 01) necessitam de cuidado intensivo.
- 02) necessitam de cuidado semi-intensivo.
- 03) têm alta dependência.
- 04) necessitam de cuidados intermediários.
- 05) têm condições de realizar o autocuidado.

Questão 28

A vacinação contra a infecção pneumocócica é indicada para

- 01) mulheres no primeiro trimestre de gestação.
- 02) pessoas com asplenia funcional ou anatômica.
- 03) pessoas que fizeram uso da vacina nos últimos 3 anos.
- 04) pacientes portadores de púrpura trombocitopênica idiopática.
- 05) pacientes com doença de Hodgkin durante o período da quimioterapia.

Questão 29

O derrame pleural se constitui por ser uma coleção de líquido no espaço pleural. Normalmente, no espaço pleural há uma pequena quantidade de líquido que age como lubrificante, permitindo as superfícies pleurais se moverem sem atrito.

A quantidade de líquido que normalmente é encontrada no espaço pleural é de, aproximadamente,

- 01) 2ml
- 02) 2,5ml
- 03) 3 a 4ml
- 04) 5 a 15ml
- 05) 30ml

Questão 30

Na assistência ao paciente com derrame pleural, em caso de o derrame apresentar-se transparente, é importante que a enfermeira saiba diferenciar se é um transudato ou exudato. Sobre esse assunto, é correto afirmar:

- 01) O achado de um derrame transudativo, geralmente significa que as membranas pleurais estão lesadas.
- 02) Um derrame transudativo resulta mais amiúde da insuficiência cardíaca.
- 03) Um exudato geralmente resulta da inflamação por produtos virais ou tumores que envolvem o espaço mais profundo da pleura.
- 04) Um exudato ocorre quando os fatores que influenciam a formação e a reabsorção de líquido pleural são modificados, em geral por distúrbios na pressão hidrostática ou oncótica.
- 05) O transudato coagula-se espontaneamente pela presença do fibrinogênio e pode ter aspecto purulento.

Questão 31

Quando um paciente apresenta pneumotórax e acontece à remoção de ar, pode ocorrer edema pulmonar provocado

- 01) pela reinsuflação rápida do pulmão, conhecido como edema pulmonar de reexpansão.
- 02) pela vasculatura pulmonar do paciente que tenta se adaptar.
- 03) pela pressão microvascular aumentada devido à função cardíaca anormal.
- 04) pelo aumento súbito na pressão intravascular no pulmão.
- 05) pela evacuação de líquido que provoca pressão pulmonar rápida.

Questão 32

A úlcera de pressão que se apresenta hiperemiada, acompanhada de flictemas e de uma ruptura não profunda da pele, encontra-se em estágio

- 01) I
- 02) II
- 03) III
- 04) IV
- 05) V

Questão 33

Na assistência de enfermagem ao paciente com ferida, para saber se o processo de sua cicatrização ocorreu por primeira intenção, é importante observar características relacionadas às extremidades, que devem estar

- 01) afastadas umas das outras com uma cicatriz maior e mais profunda.
- 02) extensamente separadas, e a ferida bastante profunda.
- 03) próximas umas das outras, com espaço entre elas estreito.
- 04) com tecido granular formado em direção ao centro que tem maior profundidade.
- 05) com as bordas unidas por algum material para sutura.

Questão 34

Na assistência de enfermagem ao paciente com insuficiência cardíaca à direita, observam-se sintomas, como

- 01) ortopneia, hipóxia.
- 02) ascite e ganho de peso.
- 03) estertores crepitantes, cianose.
- 04) dispneia paroxística noturna e fadiga.
- 05) tosse com escarro róseo, terceira bulha cardíaca.

Questão 35

A educação do paciente e família, sobre a insuficiência cardíaca deve contemplar

- 01) seguir uma dieta rica em lipídios e proteínas.
- 02) medir, a cada 15 dias, a frequência, o pulso e a pressão arterial.
- 03) checar o peso, mensalmente variando a balança e o horário.
- 04) manter os membros inferiores mais baixos, quando estiver sentado.
- 05) notificar uma frequência cardíaca inferior a 60 e superior a 120bpm, antes de tomar os digitálicos.

CONSULTEC – Consultoria em Projetos Educacionais e Concursos Ltda.

Instituição: **OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE**

CARGO: **ENFERMEIRO - CLÍNICA MÉDICA CIRÚRGICA ADULTO**

DATA: **18/05/2014**

GABARITO PÓS-RECURSO

Prova de Língua Portuguesa		Prova de Matemática		Prova de Conhecimentos Gerais		Prova de Conhecimentos Específicos	
Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta
1)	04	11)	02	14)	05	21)	02
2)	05	12)	05	15)	01	22)	03
3)	02	13)	Anulada	16)	05	23)	01
4)	04			17)	01	24)	01
5)	03			18)	03	25)	03
6)	05			19)	02	26)	04
7)	01			20)	01	27)	03
8)	03					28)	02
9)	02					29)	04
10)	01					30)	02
						31)	01
						32)	02
						33)	03
						34)	02
						35)	05