

## Questões de 21 a 35

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.

### Questão 21

Na assistência ao paciente hipovolêmico, a enfermeira deve monitorar rigorosamente os sinais vitais, observando a presença de

- 01) pulso dicrótico e forte, hipotensão postural e aumento de temperatura.
- 02) pulso fraco e lento, hipertensão postural e diminuição da temperatura.
- 03) pulso rápido e forte, hipotensão postural e aumento de temperatura.
- 04) pulso rápido e fraco, hipotensão postural e diminuição da temperatura.
- 05) pulso rápido e dicrótico, hipertensão postural e aumento da temperatura.

### Questão 22

Quando um paciente apresenta reações anafiláticas, podem-se identificar como brandas aquelas que apresentam, dentre outras manifestações,

- 01) formigamento periférico e uma sensação de calor com início dos sintomas nas primeiras duas horas depois da exposição.
- 02) rubor, calor, ansiedade e prurido com início dos sintomas dez horas depois da exposição.
- 03) edema periorbital, espirros e lacrimejamento com início dos sintomas até vinte quatro horas depois da exposição.
- 04) dispneia, cianose e hipotensão com início dos sintomas três horas depois da exposição.
- 05) tosse, sibilos e dispneia intensa com início dos sintomas até três dias depois da exposição.

### Questão 23

Nas emergências hipertensivas, a assistência de enfermagem deve ser baseada

- 01) na administração de medicamentos por via oral, evitando traumas periféricos, que podem agravar o quadro.
- 02) na instalação de medicação anti-hipertensiva em bomba de infusão controlada a cada vista do médico assistente.
- 03) na monetarização da PA e do nível de consciência, após retorno da tomografia computadorizada.
- 04) na punção de acesso venoso central imediatamente, após a admissão.
- 05) no controle dos sinais vitais a cada 5 minutos, quando o paciente estiver em uso de drogas vasodilatadoras até a redução da pressão.

### Questão 24

Na assistência de enfermagem ao paciente com insuficiência respiratória aguda, é importante identificar os fatores desencadeadores.

Assim, associe a primeira coluna com a segunda.

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Trauma             | ( ) sepse.                              |
| 2. Infecção           | ( ) picada de abelha ou outro veneno.   |
| 3. Reação alérgica    | ( ) vômito.                             |
| 4. Aspiração pulmonar | ( ) ferida por projétil ou arma branca. |
| 5. Fator mecânico     | ( ) pneumotórax.                        |

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 01) 1, 2, 3, 4, 5 | 04) 4, 3, 2, 1, 5 |
| 02) 2, 3, 4, 1, 5 | 05) 5, 1, 4, 3, 2 |
| 03) 3, 4, 5, 1, 2 |                   |

### Questão 25

Sobre as intervenções de enfermagem, durante a insuficiência respiratória aguda, identifique com **V** as afirmativas verdadeiras e com **F**, as falsas.

- ( ) Avalia a frequência e a profundidade da respiração, sinais de cianose e sintomas de sofrimento respiratório.
- ( ) Solicita exames, como gasometria venosa e oximetria de pulso.
- ( ) Institui medidas para prevenir complicações respiratórias, como mudanças de decúbito.
- ( ) Orienta o paciente sem dar explicações sobre os cuidados prestados para evitar ansiedade.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a

- |             |             |
|-------------|-------------|
| 01) V V F F | 04) F V V F |
| 02) V F V F | 05) V V V V |
| 03) F F V V |             |

### Questão 26

Em caso de obstrução da via aérea superior em crianças, uma das principais causas relacionadas a anomalias congênitas é

- 01) traqueíte.
- 02) microglossia.
- 03) papilomatose.
- 04) hipoplasia mandibular.
- 05) supraglótica peritonsilar.

**Questão 27**

Nos casos de cetoacidose diabética em crianças, a enfermagem deve monitorar o nível de consciência através da aplicação da escala de Glasgow a cada

- 01) 10 minutos nas primeiras duas horas e de 1/1 hora até 24 horas, se o paciente estiver consciente e estável.
- 02) 30 minutos nas primeiras duas horas e de 1/1 hora até 12 horas, se o paciente estiver consciente e estável.
- 03) 45 minutos e depois somente quando for verificar os sinais vitais que devem estar prescritos a cada 6 horas.
- 04) 1 hora, e se o paciente não apresentar alterações dos exames laboratoriais.
- 05) alteração inesperada no quadro clínico, pois esse requer investigação e pode determinar mudanças no tratamento.

**Questão 28**

Criança, 5 anos de idade, foi levada à emergência de um hospital pediátrico, apresentando ao exame físico: pele avermelhada, mucosas secas e taquicardia.

Esses dados podem indicar uma intoxicação

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| 01) calinérgica. | 04) barbitúrica. |
| 02) cáustica.    | 05) digitálica.  |
| 03) atropínica.  |                  |

**Questão 29**

Em caso de crise convulsiva em crianças, a administração de Diazepam, conforme prescrição médica, deve ser seguida pela atenção da enfermeira em relação à possibilidade de depressão

- 01) respiratória e recorrência da crise devido a seu curto tempo de ação.
- 02) do nível de consciência e recorrência da crise pela demora do início da ação.
- 03) da temperatura corporal e recorrência da crise devido a seu longo tempo de ação.
- 04) circulatória e recorrência da crise pelo rápido início da ação.
- 05) imunológica e recorrência da crise devido a seu moderado tempo de ação.

**Questão 30**

De uma criança menor de um ano, apresentando parada cardiorespiratória.

Na avaliação pré-hospitalar, em relação à circulação, a enfermeira acertadamente deve palpar o pulso

- 01) braquial, que é palpável na face interna do terço médio do braço, com o indicador e o dedo médio.
- 02) femoral, que é palpável na fúrcula esternal, com o indicador e o dedo médio.
- 03) pediosa, que é palpável por detrás do maléolo medial, com o indicador e o dedo médio.
- 04) temporal, que é palpável na borda interna do músculo esternocleidomastóideo, com ligeira flexão lateral da cabeça, com o indicador e o dedo médio.
- 05) radial, que é palpável na união do terço médio e terço interno da arcada crural, com o indicador e o dedo médio.

**Questão 31**

Ao prestar assistência a uma criança de 7 anos de idade, em unidade hospitalar, a enfermeira observa que os níveis pressóricos se encontram em 109mmHg x 70mmHg. Assim, ela detecta uma emergência hipertensiva.

Para que haja o controle da situação, a enfermeira se baseia nas variáveis fisiológicas normais esperadas da pressão arterial para esta idade, a qual deve ser de

- 01) 74 X 51mmHg
- 02) 85 X 64mmHg
- 03) 97 X 58mmHg
- 04) 100 X 66mmHg
- 05) 104 X 66mmHg

**Questão 32**

Na assistência ao paciente com cetoacidose diabética, a enfermeira deve realizar a educação em saúde com a finalidade de prevenir sua recorrência.

Assim, são necessárias informações sobre o esquema terapêutico destinado à cetoacidose diabética, que deve incluir

- 01) injeção da dose quinzenal habitual de insulina ou administração de agente hipoglicemiante oral.
- 02) automonitorização frequente da glicemia, a cada 4 horas, ou, no mínimo, 4 vezes ao dia.
- 03) orientação sobre a busca pelo serviço médico, que somente deve ser feita quando a cetogênese estiver instalada.
- 04) Injeções de altas doses suplementares de insulina de ação curta várias vezes ao dia, independente dos resultados da glicemia.
- 05) dieta que inclua ingestão liberal de líquidos e carboidratos usadas por diabéticos em qualquer fase ou manifestação da doença, sendo que, no momento em que seja constatada a cetoacidose diabética, essa dieta deve ser suspensa.

**Questão 33**

Em um paciente com crise convulsiva, ao diagnosticar alto risco de lesão relacionado à alteração da consciência, o enfermeiro deve seguir as seguintes intervenções:

- 01) Acolchoar as grades do leito e mantê-lo em posição alta para melhor visualização.
- 02) Manter a via aérea livre de qualquer instrumento ou abaixador de língua durante a convulsão, para evitar que o paciente engasgue.
- 03) Observar se há aspiração durante a convulsão; deixar o paciente em decúbito dorsal.
- 04) Orientar ao paciente a deitar antes da convulsão, caso tenha um aviso prodromico.
- 05) Retirar acessos e tubos durante a atividade convulsiva, para evitar que o paciente tenha lesões provocadas por material contundente.

Questão 34

Em uma reanimação cardiopulmonar de um neonato, o acesso mais rápido para administrar medicamentos é através da

- 01) via traqueal e veia umbilical.
- 02) via Intraóssea e artéria umbilical.
- 03) artéria umbilical e veia periférica.
- 04) acesso periférico e via intraóssea.
- 05) acesso subcutâneo e artéria umbilical.

Questão 35

Paciente mordido por cobra deve ter os primeiros socorros imediatos no local da mordida, que incluem

- 01) aplicar gelo no local do ferimento.
- 02) fazer um torniquete com o intuito de conter o sangramento.
- 03) cobrir a ferida com um pano úmido embebido em antisséptico
- 04) manter a parte corporal lesada abaixo do nível do coração.
- 05) fazer a pessoa manter-se em pé, para evitar que o veneno circule rapidamente pelo corpo.

\* \* \* \* \*

CONSULTEC – Consultoria em Projetos Educacionais e Concursos Ltda.

Instituição: **OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE**

CARGO: **ENFERMEIRO - EMERGÊNCIA**

DATA: **18/05/2014**

---

## GABARITO PÓS-RECURSO

Prova de Língua Portuguesa		Prova de Matemática		Prova de Conhecimentos Gerais		Prova de Conhecimentos Específicos	
Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta
1)	<b>04</b>	11)	<b>02</b>	14)	<b>05</b>	21)	<b>04</b>
2)	<b>05</b>	12)	<b>05</b>	15)	<b>01</b>	22)	<b>01</b>
3)	<b>02</b>	13)	<b>Anulada</b>	16)	<b>05</b>	23)	<b>05</b>
4)	<b>04</b>			17)	<b>01</b>	24)	<b>02</b>
5)	<b>03</b>			18)	<b>03</b>	25)	<b>02</b>
6)	<b>05</b>			19)	<b>02</b>	26)	<b>04</b>
7)	<b>01</b>			20)	<b>01</b>	27)	<b>02</b>
8)	<b>03</b>					28)	<b>03</b>
9)	<b>02</b>					29)	<b>01</b>
10)	<b>01</b>					30)	<b>01</b>
						31)	<b>03</b>
						32)	<b>02</b>
						33)	<b>04</b>
						34)	<b>01</b>
						35)	<b>04</b>