

Questões de 21 a 35

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.

Questão 21

Quanto à Assistência ao paciente em PCR, é correto afirmar:

- 01) O material a ser utilizado deve estar disposto no carrinho de emergência, que deverá ser verificado diariamente pelo médico de plantão.
- 02) O carro de emergências deverá ter rodinhas, contendo todos os itens necessários, dentre os quais estão seringas, luvas, medicações de emergência.
- 03) O pessoal de enfermagem que responde ao chamado na Parada deve deslocar o paciente até o carrinho de emergência, nunca o contrário, por causa do fluxômetro de O₂, preso na parede.
- 04) Dentre as medicações de emergência, estão Dopamina, Lidocaína, Adenosina, Dipirona.
- 05) A bandeja de dissecação venosa deverá estar a postos, para que o técnico de enfermagem proceda a dissecação, caso haja necessidade.

Questão 22

Um objeto é considerado estéril quando ele está completamente livre de micro-organismos vivos.

Sendo assim, é correto afirmar:

- 01) A movimentação da equipe cirúrgica deve-se dar entre uma área estéril para outra e de uma área não estéril para outra.
- 02) A movimentação da equipe cirúrgica deverá ser sempre da área estéril para a não estéril.
- 03) A instrumentadora e os instrumentais somente deverão estar em áreas contaminadas, para não contaminar a área estéril.
- 04) Quando um técnico abre um invólucro estéril, o lado mais próximo do corpo é aberto depois.
- 05) Em um campo estéril, sua parte anterior e posterior são considerados estéreis.

Questão 23

Quanto à Central de Material Esterilizado, é correto afirmar:

- 01) Em processos realizados na autoclave, dispensa-se a limpeza manual do instrumental.
- 02) O manuseio do material a ser limpo/processado não exige vestimenta específica, apenas alguns EPI's, tais como máscara e luva de procedimento.
- 03) Ao transportar o material sujo a ser processado, são utilizadas caixas, que não poderão ser plásticas jamais, pelo risco de contaminação.
- 04) Em muitos hospitais, se utiliza a limpeza mecânica e a autoclave, em conjunto.
- 05) Os materiais cortantes devem ser acondicionados numa bacia ampla, permitindo o seu fácil acesso ao profissional.

Questão 24

Na recuperação pós-anestésica, é correto afirmar:

- 01) É incomum que ocorram náuseas ou vômitos, devendo estes serem comunicados ao médico de plantão, pois pode ser indicativo de hemorragia digestiva.
- 02) É comum uma alteração neurológica na primeira hora, como agitação, tremores, hiperreflexia, hipertonidade e clônus.
- 03) A hipoxemia deverá ser corrigida retirando o suporte de O₂, rapidamente.
- 04) No CRPA, pode e deve-se administrar medicação por via oral, principalmente para dor.
- 05) O paciente, quando apresenta náuseas no CRPA, uma medida simples e possível é oferecer 30ml de água, para melhora dos sintomas.

Questão 25

Ainda sobre recuperação pós-anestésica, pode-se afirmar:

- 01) A verificação da pressão arterial deverá ser realizada apenas pelo enfermeiro, sendo essa a sua função exclusiva, não devendo ser delegada ao técnico de enfermagem.
- 02) O tratamento da hipertensão pós-cirúrgica sempre será com grande quantidade de solução fisiológica.
- 03) Na hipotensão, a estabilização hemodinâmica do paciente deve anteceder à procura das causas para ela ter ocorrido.
- 04) Na hipotensão, a estabilização hemodinâmica do paciente deve ocorrer após a certeza das causas para a sua ocorrência.
- 05) Nas disritmias cardíacas, o paciente não sentirá dor.

Questão 26

Na Parada Cardiorrespiratória no adulto, é correto afirmar:

- 01) A sequência no atendimento é A (vias aéreas), B (respiração), C (compressões).
- 02) O ritmo das compressões cardíacas deve chegar a 100 compressões em um minuto, para garantir fluxo cerebral adequado.
- 03) O ritmo das compressões cardíacas deve chegar a 30 compressões em um minuto, para garantir fluxo cerebral adequado.
- 04) As vias aéreas do paciente devem estar pérvias, e, para garantir isso, o profissional deve colocar o dedo entre os dentes do paciente, para que ele não se sufoque com a língua.
- 05) Na RCP, o suporte ventilatório deverá ser instalado antes do início das compressões cardíacas.

Questão 27

Após o procedimento cirúrgico, no pós-operatório imediato, deverá ser observado:

- 01) Características do curativo, se limpo e seco, bem como sinais de hipo ou hipertensão, nível de consciência do paciente, sinais vitais.
- 02) Débito urinário (o paciente deverá urinar imediatamente após a cirurgia), posição no leito (paciente deverá permanecer em Fowler).
- 03) Acordar o paciente, manter membros inferiores elevados, retirar o curativo, se necessário (quanto mais cedo retirar, melhor a cicatrização).
- 04) Chamar o paciente pelo nome, observando as suas reações, o curativo compressivo na incisão cirúrgica, contagem de gazes e compressas.
- 05) Observar sinais vitais, acordar o paciente, retirar o oxigênio para a observação.

Questão 28

Em relação ao processamento de material na central de material esterilizado, pode-se afirmar:

- 01) Para a efetividade dos procedimentos, precisa haver limpeza, desinfecção, esterilização, transporte e armazenamento.
- 02) Com os instrumentais não é necessário utilizar processamento químico, apenas físico, através da autoclave.
- 03) Antes da limpeza do instrumental, deve haver separação de material, no entanto não é necessária a separação de tesouras ou pinças, e sim apenas separação do material sujo do limpo.
- 04) O material mais pesado deverá estar acima do material leve, sobrepostos nas caixas.
- 05) A esponja de aço poderá ser utilizada em alguns materiais.

Questão 29

Sobre a limpeza do material da área do Centro Cirúrgico, é correto afirmar:

- 01) No piso, deverá haver apenas desinfecção semanal, que substitui a limpeza.
- 02) Nas janelas, deverá haver a limpeza ou desinfecção, com água e sabão ou detergente.
- 03) Nos aparelhos de telefone, bancada, deverão ser utilizados água e sabão, nunca o álcool a 70%.
- 04) No teto, deverá ser realizada a varredura seca.
- 05) A limpeza pesada dos esgotos e rodapés deverá ser realizada diariamente.

Questão 30

Em relação à limpeza e desinfecção do laringoscópio utilizado no centro cirúrgico, pode-se afirmar:

- 01) Realizada uma limpeza prévia com água e clorexidina, após isso, mergulhá-lo numa solução com álcool.
- 02) Deverá ser mergulhado numa solução com água e detergente enzimático, lavando com a esponja e, após seco, utilizar o álcool a 70%.

- 03) Deverá ser mergulhado numa solução com água e detergente enzimático, sem necessidade de lavar com esponja.
- 04) Deverá ser mergulhado numa solução com água e detergente enzimático, lavando com a esponja, sem necessidade do álcool a 70% depois.
- 05) Após limpo, ele deverá ser guardado em campos estéreis. Cabo e lâmina.

Questão 31

Sobre a Central de material esterilizado, é correto afirmar:

- 01) A área limpa é aquela que abrange área de preparo, área de esterilização, área de armazenamento, área de distribuição.
- 02) A área limpa também abrange a área de recepção pós-cirúrgica.
- 03) A limpeza tem como objetivo apenas deixar matéria orgânica.
- 04) Para a limpeza, não é necessária a fricção.
- 05) Limpeza nem sempre precede a esterilização.

Questão 32

Sobre os Detergentes enzimáticos, pode-se afirmar:

- 01) São bactericidas.
- 02) Têm difícil enxágue.
- 03) São tóxicos.
- 04) São atóxicos e de fácil enxágue.
- 05) São corrosivos.

Questão 33

No âmbito da medicina, a desinfecção tem como objetivo eliminar o risco de contágio por parte de agentes patogênicos. Sobre desinfecção, é correto afirmar:

- 01) São sempre de baixo nível.
- 02) São sempre de alto nível.
- 03) Podem ser de baixo, médio ou alto nível.
- 04) Nenhum dos produtos é irritante de vias aéreas (o profissional não precisa usar máscaras).
- 05) Nenhum deles impregna matéria orgânica.

Questão 34

Quanto à desinfecção com álcool, pode-se afirmar:

- 01) Tem ação longa e de alto custo.
- 02) Tem ação curta e alto custo.
- 03) Pode danificar ou enrijecer alguns materiais.
- 04) Pode ser utilizado em lentes.
- 05) É pouco inflamável.

Questão 35

Na desinfecção física, é correto afirmar:

- 01) Deve-se enxaguar em água estéril, após o procedimento de desinfecção.
- 02) Após a desinfecção, não há necessidade de enxágue.
- 03) Não há necessidade de secar depois.
- 04) Os artigos podem ser processados montados, não há necessidade de desmontar.
- 05) A desinfecção física sempre deverá ser realizada após a química.

CONSULTEC – Consultoria em Projetos Educacionais e Concursos Ltda.

Instituição: **OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE**

CARGO: **TÉCNICO EM ENFERMAGEM - CENTRO CIRÚRGICO - CME**

DATA: **18/05/2014**

GABARITO PÓS-RECURSO

Prova de Língua Portuguesa		Prova de Matemática		Prova de Conhecimentos Gerais		Prova de Conhecimentos Específicos	
Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta
1)	04	11)	02	14)	04	21)	02
2)	03	12)	04	15)	01	22)	01
3)	02	13)	01	16)	03	23)	04
4)	05			17)	01	24)	02
5)	03			18)	*01	25)	03
6)	01			19)	04	26)	02
7)	04			20)	05	27)	01
8)	05					28)	01
9)	02					29)	02
10)	02					30)	02
						31)	01
						32)	04
						33)	03
						34)	03
						35)	01

***GABARITO ALTERADO**