

Questões de 21 a 35

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.

Questão 21

A alternativa que apresenta corretamente o algoritmo de parada cardiopulmonar é a

- 01) 15 compressões e 2 ventilações, ritmo acima de 100 compressões por minuto.
- 02) 30 compressões e 1 ventilação, ritmo de até 150 compressões por minuto.
- 03) 30 compressões e 2 ventilações, ritmo acima de 100 compressões por minuto.
- 04) 15 compressões e 2 ventilações, ritmo de até 100 compressões por minuto.
- 05) 30 compressões e 2 ventilações, ritmo de até 100 compressões por minuto.

Questão 22

Relacione as colunas:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1- Pneumonia | () Uma coleção de líquido no espaço pleural. |
| | () Inflamação do parênquima pulmonar causada por diversos micro-organismos, incluindo bactérias, microbactérias, clamídias, micoplasma, fungos, parasitas e vírus. |
| 2- Derrame Pleural | () Acúmulo anormal de líquido no tecido pulmonar, no espaço alveolar ou em ambos. |
| | () Paciente apresenta febre, calafrios e dor torácica pleurítica. |
| 3 - Edema Agudo de Pulmão | () Pode resultar em dispneia, dificuldade para deitar na posição horizontal e tosse. |
| | () Paciente apresenta dispneia, "fome de ar" e cianose central. |

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a

- 01) 1, 2, 3, 1, 3, 2.
- 02) 3, 1, 2, 1, 1, 2.
- 03) 2, 1, 3, 1, 2, 3.
- 04) 1, 3, 2, 3, 2, 1.
- 05) 1, 1, 3, 1, 3, 1.

Questão 23

São cuidados da enfermagem nos pacientes com Derrame Pleural, **exceto**:

- 01) O(a) enfermeiro(a) é responsável por preparar e posicionar o paciente para toracocentese.
- 02) O(a) enfermeiro(a) não precisa registrar a quantidade de líquido de toracocentese e enviar para os exames laboratoriais.
- 03) O(a) enfermeiro(a) deve, quando se utiliza o selo d'água, monitorar o funcionamento do sistema e registrar a quantidade de drenagem nos intervalos prescritos.
- 04) Assegurar-se de que a aspiração está funcionando e manter os tubos permeáveis.
- 05) Observar e contatar o médico imediatamente, se houver sinal de respiração, cianose, pressão no tórax, enfisema subcutâneo ou sinais de hemorragia.

Questão 24

Sobre os tipos de Pneumonias, é correto afirmar:

- 01) A pneumonia hospitalar é sinônimo de pneumonia nosocomial.
- 02) A pneumonia hospitalar é definida como início dos sintomas de pneumonias com mais de 72 horas depois da admissão nos pacientes, sem evidência de infecção no momento da internação.
- 03) Não existe relação entre a ocorrência de pneumonia e os pacientes imunocomprometidos.
- 04) A pneumonia é um distúrbio que só acontece em pacientes internados.
- 05) A pneumonia é uma inflamação do parênquima pulmonar causada apenas por bactérias.

Questão 25

A Insuficiência Cardíaca consiste na incapacidade do coração para bombear sangue suficiente para atender às necessidades teciduais de oxigênio e nutrientes.

Nesse contexto, o profissional deve estar atento aos seguintes sinais e sintomas:

- 01) Pele pálida e cianótica, dispneia, vertigem e bradicardia.
- 02) Pele corada, tosse aos esforços, tontura, taquicardia.
- 03) Pele pálida e cianótica, alteração do estado mental, náuseas, dispneia de esforço, taquicardia.
- 04) Pele cianótica, frequência urinária aumentada, taquicardia, alteração do estado mental.
- 05) Pele cianótica, bradicardia, frequência urinária diminuída, tontura, náuseas.

Questão 26

Em relação ao cuidado de enfermagem para os pacientes com Insuficiência cardíaca no ambiente de internação e ambulatorial, pode-se afirmar, **exceto**:

- 01) O paciente com insuficiência cardíaca deve ser pesado diariamente, de preferência no mesmo horário.
- 02) Deve examinar o turgor da pele e as mucosas para observar os sinais de desidratação.
- 03) Monitorar a frequência de pulso e a pressão arterial.
- 04) Identificar e avaliar a gravidade do edema dependente.
- 05) Não precisa avaliar o balanço hídrico, já que não apresentam problema renal.

Questão 27

São considerados fatores de risco para o *diabetes melitus*:

- 01) Idade \leq 20 anos.
- 02) Idade \leq 30 anos.
- 03) Glicemia de jejum prejudicada ou tolerância à glicose prejudicada, previamente identificadas.
- 04) Nível de colesterol HDL \leq 50 mg/dL.
- 05) IMC \geq 20 kg/m².

Questão 28

Em relação à diarreia, pode-se afirmar:

- 01) Diarreia é uma frequência aumentada de eliminações fecais (mais de 5 por dia), uma quantidade aumentada de fezes (mais de 100g por dia) e a consistência inalterada.
- 02) A diarreia crônica está mais frequentemente associada à infecção e, em geral, é autolimitada.
- 03) Durante um episódio de diarreia aguda, não é necessário que a enfermeira incentive o repouso no leito.

04) Alguns processos patológicos podem estar associados à diarreia, como os distúrbios nutricionais e de má absorção, defeito do esfíncter anal, síndrome de Zollinger-Ellison, íleo paralítico, obstrução intestinal e síndrome da imunodeficiência adquirida.

05) As fezes aquosas são características dos distúrbios do intestino grosso, enquanto as fezes pastosas e semissólidas estão frequentemente associadas aos distúrbios do intestino delgado.

Questão 29

Sobre as complicações agudas principais do *diabetes melitus*, pode-se afirmar:

- 01) A hipoglicemia pode ser causada pelo excesso de insulina ou agentes hipoglicemiantes orais, muito pouco alimento ou atividade física excessiva.
- 02) A hipoglicemia pode ser causada pelo excesso de insulina ou agente hipoglicemiantes orais, pouco alimento ou pouca atividade física.
- 03) Os três aspectos clínicos principais da Cetoacidose Diabética (DKA) são hipoglicemia, desidratação e perda de eletrólitos e acidose.
- 04) A Síndrome Não Cetótica Hiperosmolar Hiperglicêmica (SNCHH) leva a hipertensão, desidratação profunda, bradicardia e a sinais neurológicos variáveis.
- 05) Nos casos de Síndrome Não Cetótica Hiperglicêmica, não é necessário monitorar o estado hídrico e o débito urinário, já que não apresenta risco de insuficiência renal secundária à desidratação grave.

Questão 30

A cirurgia pode ser classificada de acordo com o grau de necessidade envolvida em emergência, urgência, necessária, eletiva e opcional.

Com base nesse conceito, relacione as colunas:

- | | |
|---------------|--|
| 1. Emergência | () O paciente deverá fazer a cirurgia, como exemplo tem-se a reparação de cicatrizes, hérnia simples e reparação vaginal. |
| 2. Urgência | () A decisão fica por conta do paciente. |
| 3. Necessária | () O paciente requer atenção imediata, pois o distúrbio pode ter risco de vida. |
| 4. Eletiva | () O paciente precisa fazer a cirurgia, mas esta pode ser planejada dentro de algumas semanas ou meses. |
| 5. Opcional | () O paciente requer atenção imediata, a cirurgia deve ser realizada dentro de 24 a 30 horas. |

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a

- 01) 2, 3, 4, 1, 5.
- 02) 5, 1, 3, 2, 4.
- 03) 3, 5, 2, 4, 1.
- 04) 4, 2, 3, 5, 1.
- 05) 4, 5, 1, 3, 2.

Questão 31

Em relação aos princípios básicos da técnica asséptica na fase intraoperatória, pode-se afirmar, **exceto**:

- 01) Todos os materiais em contato com a ferida cirúrgica ou usados dentro do campo estéril devem ser estéreis.
- 02) A administração rotineira de hiperoxia (altos níveis de oxigênio) é recomendada para reduzir as infecções do sítio cirúrgico.
- 03) O movimento da equipe cirúrgica são de áreas estéreis para estéreis e de áreas não estéreis para não estéreis.
- 04) Todo campo estéril deve ser constantemente monitorado e mantido estéril.
- 05) Sempre que uma barreira estéril é rompida, a área deve ser considerada contaminada.

Questão 32

Enfermeira, 30 anos de idade, cortou a mão esquerda ao abrir pacote com um canivete desconhecido. O técnico de enfermagem, ao verificar a carteira de vacinação, constatou que a funcionária havia recebido o reforço da vacina dT quando tinha 28 anos.

Nessa situação, o enfermeiro deve orientá-la a receber o próximo reforço dessa vacina

- 01) imediatamente.
- 02) aos 38 anos.
- 03) aos 35 anos.
- 04) não precisa mais vacinar, pois já tomou reforço.
- 05) deve ignorar a situação e reiniciar o esquema vacinal.

Questão 33

Sobre a vacinação contra a Hepatite B, é correto afirmar:

- 01) De acordo com a Portaria do MS, de 2009, as gestantes não podem ser vacinadas contra a Hepatite B, independente da faixa etária gestacional.
- 02) A vacina Hepatite B deve ser administrada apenas aos 09 meses de idade e em três doses.
- 03) Desde 2013, todas as pessoas menores de 50 anos têm direito à vacina da Hepatite B.
- 04) A vacina da Hepatite B deve ser administrada via subcutânea, em três doses, com intervalos 0, 30 e 180 dias.
- 05) Os bombeiros e policiais militares, por não pertencerem a grupo de risco, não podem ser vacinados.

Questão 34

São fatores que retardam ou impedem a cicatrização de lesões abertas, **exceto**

- 01) idade.
- 02) uso de curativos não industrializados.
- 03) uso de antibióticos sistêmicos.
- 04) presença de infecção na ferida.
- 05) estado nutricional.

Questão 35

Os pacientes podem apresentar diversos tipos de feridas: aguda e ou crônica.

Assinale a alternativa que apresenta apenas feridas agudas

- 01) Lesão por pressão e queimadura.
- 02) Úlcera diabética e úlcera varicosa.
- 03) Queimadura e ferida cirúrgica.
- 04) Ferida cirúrgica e úlcera isquêmica.
- 05) Úlcera de pressão e úlcera vascular.

* * * * *

CONSULTEC – Consultoria em Projetos Educacionais e Concursos Ltda.

Instituição: **OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE**

CARGO: **TÉCNICO EM ENFERMAGEM - CLÍNICA MÉDICO CIRÚRGICA**

ADULTO

DATA: **18/05/2014**

GABARITO PÓS-RECURSO

Prova de Língua Portuguesa		Prova de Matemática		Prova de Conhecimentos Gerais		Prova de Conhecimentos Específicos	
Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta
1)	04	11)	02	14)	04	21)	03
2)	03	12)	04	15)	01	22)	03
3)	02	13)	01	16)	03	23)	02
4)	05			17)	01	24)	01
5)	03			18)	*01	25)	03
6)	01			19)	04	26)	05
7)	04			20)	05	27)	03
8)	05					28)	04
9)	02					29)	01
10)	02					30)	05
						31)	02
						32)	02
						33)	03
						34)	03
						35)	03

***GABARITO ALTERADO**