

Questões de 21 a 35

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.

Questão 21

“De todos os pacientes com câncer progressivo, estima-se que, pelo menos, 80% experimentam dor”. (SAUNDERS; BOOTH, 2003)

Sobre a dor oncológica, é **correto** afirmar:

- 01) Todo tipo de câncer provoca dor.
- 02) Todo paciente oncológico apresenta apenas dor aguda.
- 03) O paciente em tratamento oncológico em geral não se queixa de dor.
- 04) Como em outras situações que envolvem dor, a experiência da dor do câncer é influenciada por fatores físicos e psicossociais.
- 05) Quimioterapia e radioterapia não influenciam a ocorrência de dor.

Questão 22

Sobre a dor oncológica, pode-se afirmar:

- 01) A dor no câncer indica que o tumor está crescendo.
- 02) Antidepressivos não são drogas utilizadas para aumentar a tolerância à dor.
- 03) A fadiga, a ansiedade, medo da morte não influenciam na intensidade da dor.
- 04) O tratamento da dor em oncologia baseia-se apenas na combinação de drogas analgésicas.
- 05) O sucesso do controle da dor no câncer pode estar numa combinação de drogas, principalmente de analgésicos, ansiolíticos e antidepressivos.

Questão 23

“De acordo com a organização Mundial da saúde, a dor oncológica deve ser tratada em três etapas”. (HOUGH; PORTENOY, 2004)

Acerca dessas etapas, pode-se afirmar, **exceto**:

- 01) Os analgésicos não opioides são administrados para dor branda.
- 02) Os analgésicos opioides fortes não podem ser administrados por conta do risco de efeitos colaterais.
- 03) A codeína é um exemplo de analgésico opioide fraco.
- 04) O tipo de analgésico administrado é baseado no nível de dor do paciente.
- 05) A quantidade e o tipo de droga podem ser aumentados até que o controle da dor seja alcançado.

Questão 24

Sobre a infecção no paciente oncológico, é **correto** afirmar:

- 01) A equipe de enfermagem deve estar sempre atenta aos possíveis sinais de infecção, já que esta é uma das principais complicações do paciente oncológico.
- 02) A febre não é um sinal importante de infecção no paciente oncológico.
- 03) Paciente em uso de quimioterapia não deve usar antibiótico.

- 04) Os fungos não causam infecções em pacientes oncológicos porque esses são imunossuprimidos.
- 05) A *Cândida albicans* é um exemplo de bactéria causadora de infecção nos pacientes com câncer.

Questão 25

Com relação à assistência de Enfermagem ao paciente oncológico, pode-se afirmar, **exceto**:

- 01) Faz parte das atividades da enfermagem o apoio psicológico a esse paciente.
- 02) A enfermagem deve orientar o paciente a mudar seu estilo de vida e fazer repouso total durante seu tratamento contra o câncer.
- 03) A higiene das mãos e a higiene em geral são necessárias para reduzir a exposição à bactéria potencialmente perigosas a esse tipo de paciente.
- 04) A equipe de enfermagem deve estar atenta à ingestão alimentar desse paciente, pois, em geral, ingere menos calorias que a quantidade necessária para o organismo.
- 05) Os cuidados com a pele devem ser reforçados, pois esses pacientes, em geral, apresentam alteração da integridade cutâneo mucosa, principalmente aqueles restritos ao leito.

Questão 26

Acerca da assistência de enfermagem, durante o tratamento quimioterápico, é correto afirmar:

- 01) Por serem drogas indispensáveis ao paciente oncológico, em caso de extravasamento do quimioterápico, deve-se deixar concluir a administração da droga, para só então retirar o acesso venoso.
- 02) Edema, dor ou rubor local pode indicar extravasamento durante a administração do quimioterápico.
- 03) Deve-se administrar compressa morna no local da infiltração do quimioterápico.
- 04) A ausência do retorno venoso indica que o acesso venoso está bem posicionado.
- 05) Apenas o enfermeiro pode administrar substâncias vesicantes.

Questão 27

Sobre os quimioterápicos, pode-se afirmar:

- 01) As duas formas de administrar quimioterápico são a oral e a venosa.
- 02) A quantidade de quimioterápico a ser administrada ao paciente depende do tamanho do tumor.
- 03) Os pacientes submetidos à quimioterapia são aqueles nos quais não é possível tratar o tumor cirurgicamente.
- 04) Por serem agentes vesicantes, os quimioterápicos não devem ser administrados em crianças com câncer.
- 05) Por serem agentes vesicantes, os quimioterápicos, quando extravasam, podem causar necrose tissular.

Questão 28

Ainda sobre o uso de quimioterápicos e a assistência de enfermagem, pode-se afirmar, **exceto**:

- 01) O cuidado na escolha das veias periféricas, a punção habilidosa e o cuidado durante a administração do quimioterápico são essenciais.
- 02) Edema, dor ou rubor local pode indicar extravasamento.
- 03) A injeção de solução neutralizante pode reduzir a lesão tissular que o quimioterápico provoca no tecido subcutâneo, quando extravasa.
- 04) Os cateteres de longa permanência não são indicados por conta do risco de infecção e trombose.
- 05) Compressas com gelo devem ser administradas imediatamente a suspensão da administração do quimioterápico no local onde ocorreu o extravasamento.

Questão 29

A síndrome da veia cava superior (SVCS) é uma emergência oncológica caracterizada por

- 01) distúrbios auditivos.
- 02) edema apenas nos braços.
- 03) estar associada ao tumor de pulmão.
- 04) cefaleia e dor abdominal intensa.
- 05) dispneia súbita e edema nas pernas.

Questão 30

Sobre os cuidados de enfermagem ao paciente vítima da síndrome da veia cava superior (SVCS), pode-se afirmar:

- 01) Não há necessidade de avaliar estado neurológico desse tipo de paciente.
- 02) Deve-se evitar a punção venosa e a medição da pressão arterial no membro superior do lado afetado.
- 03) Drogas, como corticóides e diuréticos, não devem ser administradas.
- 04) A SVCS não é uma complicação potencialmente grave.
- 05) O diagnóstico é confirmado apenas pelo RX.

Questão 31

A alternativa que apresenta **apenas** emergências oncológicas é a

- 01) Síndrome da veia cava superior e infarto agudo do miocárdio.
- 02) Compressão da medula espinhal, síndrome da veia cava superior e pneumonia.
- 03) Hipercalemia, infarto agudo do miocárdio e síndrome da veia cava superior.
- 04) Síndrome da veia cava superior, compressão medula espinhal e hipercalemia.
- 05) Pneumonia, infarto agudo do miocárdio e trombose.

Questão 32

Sobre a coagulação intravascular disseminada, pode-se afirmar:

- 01) Também pode ser denominada coagulopatia de consumo.
- 02) Uma das manifestações deste agravo é a dor torácica.
- 03) Esta emergência oncológica não coloca o paciente em risco de morte.

- 04) Estimular a atividade física desse paciente é uma das ações de enfermagem.
- 05) As punções venosas podem ser feitas sem preocupação, pois esses pacientes não sangram com facilidade.

Questão 33

Os quimioterápicos antineoplásicos podem apresentar uma série de efeitos colaterais durante sua administração.

A alternativa que apresenta apenas os efeitos colaterais relacionados ao trato gastrointestinal é a

- 01) Náuseas e cefaleia.
- 02) Náuseas e vômitos.
- 03) Náuseas e pruridos.
- 04) Hipotensão e vômitos.
- 05) Queda de cabelo e fadiga.

Questão 34

Sobre radioterapia e assistência de enfermagem adequada, pode-se afirmar, **exceto**:

- 01) É função da enfermagem a observação rigorosa de pele e mucosas expostas à radioterapia antes e depois da exposição com objetivo de avaliar possíveis lesões ou complicações.
- 02) O paciente deve ser orientado a evitar o uso de pomadas, loções ou talcos sobre a área exposta à radiação.
- 03) O paciente que realizar radioterapia na região oral não deve escovar os dentes por conta do risco de sangramento.
- 04) A toxicidade da radioterapia é localizada na região a ser irradiada.
- 05) As principais alterações da mucosa oral relacionadas à radioterapia são estomatite e xerostomia.

Questão 35

Sobre o descarte dos resíduos quimioterápicos, é correto afirmar:

- 01) Todo produto ou material de contato com quimioterápico é considerado resíduo quimioterápico.
- 02) Os resíduos quimioterápicos podem ser descartados junto com o lixo biológico.
- 03) Os sacos de lixo adequados para o descarte desse tipo de material são aqueles de cor preta.
- 04) Os frascos de medicamentos quimioterápicos podem ser lavados e reutilizados para outros fins.
- 05) Os profissionais que manipulam esses resíduos podem usar luvas de procedimento comum.

* * * * *

CONSULTEC – Consultoria em Projetos Educacionais e Concursos Ltda.

Instituição: **OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE**

CARGO: **TÉCNICO EM ENFERMAGEM - UNIDADE DE ONCOLOGIA**

DATA: **18/05/2014**

GABARITO PÓS-RECURSO

Prova de Língua Portuguesa		Prova de Matemática		Prova de Conhecimentos Gerais		Prova de Conhecimentos Específicos	
Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta
1)	04	11)	02	14)	04	21)	04
2)	03	12)	04	15)	01	22)	05
3)	02	13)	01	16)	03	23)	02
4)	05			17)	01	24)	01
5)	03			18)	*01	25)	02
6)	01			19)	04	26)	02
7)	04			20)	05	27)	05
8)	05					28)	04
9)	02					29)	03
10)	02					30)	02
						31)	04
						32)	01
						33)	02
						34)	03
						35)	01

***GABARITO ALTERADO**